


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



برگی از درفت المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی ایران

۱۱ آزمون

برای داوطلبان مرحله دوم المپیاد ریاضی

مؤلفین  محمد جعفری

بردیا عزیزیان

حمدیم معظمی



انتشارات خوشنویس



درخت المپیاد درختی است که توسط انتشارات خوشخوان کاشته شده و هریک از کتاب‌های این پروژه برگی از آن است. وظیفه‌ی ما نگهداری و آبیاری این درخت است. امیدواریم با عنایت حضرت حق این درخت، تنومند شده و به بار واقعی بنشینند. فراموش نکنید که بار و میوه‌ی این درخت شما عزیزان می‌باشد.

التماس دعا



## پروژه‌ی درخت المپیاد

اعتقاد بر این است که شروع فعالیت‌های المپیاد به صورت حرفه‌ای، باید از ابتدای دوره‌ی دیبرستان شروع شود. آکثر المپیادهای علمی در زمستان سال سوم دیبرستان تعیین تکلیف می‌شوند. بنابراین از شروع دیبرستان تا اواسط سال سوم حدوداً ۸ ترم تحصیلی می‌شود (با احتساب فصل و ترم تابستان) که لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای این چند ترم انجام شود.

انتشارات خوشخوان این برنامه‌ریزی را در قالب پروژه‌ی درخت المپیاد انجام داده است که هر شاخه از درخت، مبحثی از آن المپیاد و هر برگ از آن شاخه شماره‌ای از آن مبحث می‌باشد.

به عنوان مثال اپتیک(۱) کتابی است که در یک ترم تحصیلی در یک کلاس ممتاز می‌توان برای داوطلبان المپیاد فیزیک تدریس کرد.

با عنایات حضرت حق و با کمک تنی چند از همکاران گرامی کتب مربوط به این درخت در هر رشته‌ای از المپیاد معرفی خواهد شد.

گروه المپیاد

انتشارات خوشخوان

## ییتگفتارناتر



مسابقه‌ها، کنکورها و المپیادهای علمی همایش‌هایی هستند که کم و بیش در سرتاسر دنیا پهناور به صورت داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود و سال به سال به تنوع، جذبه و عظمت آن‌ها افزوده می‌شود. یکی ازین همایش‌های باشکوه که هرسال در چندین رشته در سطح دانش آموزان سنتوات آخر دوره متوسطه برگزار می‌شود المپیادهای علمی می‌باشد که قدیمی ترین آن المپیاد ریاضی بوده و از سال ۱۹۵۹ آغاز و تابه حاصل داشته است.

در حال حاضر نتیجه‌ی کسب شده در المپیادهای علمی برای هر کشوری یکی از شاخص‌های قدرت علمی آن کشور محسوب شده و نفرات ممتاز این المپیادها به راحتی جذب دانشگاه‌ها و آکادمی‌های ممتاز جهان شده و پس از گذشت سنتواتی چند به موفقیت‌های چشم‌گیری نایل می‌شوند چنانچه بسیاری از دانشمندان حال حاضر در رشته‌های مختلف از جمله شیمی، فیزیک، IT و ... در سال‌های نه چندان دور از مdal آوران این المپیادها بوده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۶ در المپیاد ریاضی جهان که در کشور کویا برگزار می‌شد شرکت کرده و با کسب یک مدال برنز به مقام ۲۶ جهان نائل آمد که تعجب همگان را برانگیخت چرا که در آن سال ایران در گیرجنب تحمیلی بوده و جهانیان به غیر از جنگ و در گیری چیزی از ایران سراغ نداشتن و در خشش دانش آموزان ایران در آن سال و سنتوات بعد نگاه هارابه سمت ایران معطوف کرده و چشم خفته آن‌ها را تا حدود زیادی بیدار کرد. همانطور که از رسانه‌های گروهی مطلع شده اید در تمام المپیادهای علمی تیم اعزامی کشور عزیزمان در سنتوات گذشته جزء کشورهای برتر بوده و ضمن کسب مدال‌های رنگارنگ رتبه‌های بسیار در خشانی از جمله رتبه اول را حائز شده‌اند.

نحوه گزینش نفرات اعزامی به المپیادهای جهانی تا حدود زیادی مشابه یکدیگرند به این صورت که در ابتدا در مسابقه‌ای سراسری تحت عنوان مرحله اول که معمولاً به صورت پرسش‌های چند‌گزینه‌ای مطرح می‌شود حدوداً هزار نفر پذیرفته شده و در رقباتی معمولاً تشریحی که مرحله‌ی دوم نامیده می‌شود شرکت می‌کنند. در این مرحله در هر رشته حدوداً چهل نفر پذیرفته شده و در دوره‌ی تابستانی در باشگاه دانش پژوهان جوان که متوالی برگزاری تمام المپیادهای علمی می‌باشد شرکت کرده و پس از گذراندن این دوره مرحله‌ی سوم آزمون برگزار شده و عده‌ای (در حدود ده نفر) مدال طلا، عده‌ای مدال نقره و عده‌ای دیگر مدال برنز

کسب می کنند (در این مرحله معمولاً همه‌ی افراد شرکت کننده در دوره مدارک سب می کنند) دارندگان مدارک طلا حدود یک سال در آن باشگاه آموزش دیده و پس از آن اعضاء، تیم اعزامی شناسایی می شوند. دارندگان مدارک طلا همگی بدون کنکور و در رشته و دانشگاه دلخواه خود پذیرفته شده و ادامه‌ی تحصیل می دهند اما دارندگان مدارک های نقره و برنز همانند سایر داوطلبان در کنکور سراسری شرکت کرده و برای کسب رتبه دلخواه جهت پذیرفته شدن در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود در قابت می کنند با این تفاوت که این افراد سهمیه‌ی ویژه‌ای در پذیرفته شدن در رشته و دانشگاه مورد علاقه‌ی خود دارند که جزئیات آن در سایت باشگاه دانش پژوهان جوان تشریح شده است.

متاسفانه در سال‌های اخیر در بعضی از مدارس افرادی مثلاً لباس کارشناسی به تن کرده و علیه فعالیت‌های المپیاد جبهه می‌گیرند و ادعا می‌کنند فعالیت برای المپیادهای علمی مانع موفقیت در کنکور سراسری بوده و هرچه دانش آموز به سمت المپیاد سوق پیدا کند از کنکور فاصله گرفته و در صورت عدم کسب مدارک طلا (که بسیار محتمل است) آینده‌ی خود را تباہ کرده است در حالی که با تحقیقی که در سال‌های گذشته انجام شده است فعالیت در زمینه المپیادهای علمی نه تنها مانع فعالیت برای کنکور نیست بلکه مسیر فعالیت برای کسب رتبه مناسب در کنکور را بسیار هموارتر می سازد به عنوان مثال می توانید تمام مدارک آوران نقره و برنز ویا حتی آن‌هایی که در مرحله اول پذیرفته شده ونی به دوره تابستانی راه پیدا نکرده اند را در یک رشته شناسایی کرده و موفقیت‌های تحصیلی آن‌ها در دانشگاه‌ها جویا شوید که نگارنده‌ی این متن بارها این تحقیق را انجام داده و به مثبت بودن آن یقین پیدا کرده است.

به هر حال ادعا این است که فعالیت دانش آموز در یک رشته از رشته‌های المپیاد فواید بسیاری دارد که به تعدادی از آن‌ها به صورت گذر اشاره می‌شود:

۱. همان طور که خداوند به بشرطن سالم داده و انتظار می رود با ورزش‌ها و نرم‌ش‌های مناسب از این نعمت خدادادی محافظت شود به هر داش آموزی نیز استعدادی داده است که باید شکوفا و بهره ور شود. اغلب باشگاه‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی داوطلب زیادی در رشته‌های متفاوت ورزشی دارند که مشغول فعالیت در یکی از رشته‌های ورزشی مانند کشتی، تکواندو، بدنسازی و ... می باشند که وقتی از آن افراد راجع به اهدافشان از این فعالیت سوال می شود سالم نگه داشتن بدنه را عنوان داشته و انتخاب شدن در تیم ملی را در نهایت عنوان می کنند. چه بسا افرادی که در این رشته‌ها فعالیت می کنند و هرگز به تیم ملی راه پیدا

نمی‌کنند که وقتی از این افراد راجع به موقیت هایشان سؤال می‌شود هرگز خود را ناموفق معرفی نمی‌کنند و همین‌که توانسته اند از بدن سالم خود به روش مناسب محافظت کنند را پیروزی بزرگی می‌دانند بنابرین فعالیت دریکی از زمینه‌های المپیاد چه در نهایت به کسب مдал منجر شود و یا نشود همین‌که استعداد خدادادی پرورش می‌یابد موقیتی است بس بزرگ.

۲. کتب درسی به اذعان اکثر کارشناس‌ها و اساتید سال به سال ساده‌تر شده و برای عموم داش آموزان دلچسب هستند ولی برای دانش آموزان ممتاز و تیزهوش به هیچ عنوان اغنا کننده نمی‌باشند لذا لازم است این سری از داش آموزان فعالیت ویژه‌ای را در رشته‌ی مورد علاقه‌ی خود داشته باشند تا احساس کنند این فعالیت‌ها برای آن‌ها اغنا کننده است.

۳. فعالیت‌های المپیادی که در نهایت به حل سؤالات پیچیده و عمیق در رشته‌ی مربوطه می‌شود باعث می‌شود تا فرد به تمام مسائل جامعه و پیش آمده در زندگی به دید یک مسئله‌ی المپیاد نگاه کرده و در حل آن نسبت به سایر رقبا موفق تر باشند. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که با علاقه و اشتیاق حداقل یکی از شاخه‌های المپیاد را دنبال می‌کنند (نه به نیت کسب مдал بلکه به نیت پرورش ذهن) نسبت به سایر افراد در زندگی موفق‌ترند.

۴. زیرینای اکثر دروس پیش دانشگاهی در دروس المپیاد بنا نهاده می‌شود بنابرین افرادی که به سبک المپیادی دروس خود را مطالعه می‌کنند در دوره پیش دانشگاهی با پایه‌ی بسیار قوی تری با دروس مواجه می‌شوند و نسبت به رقبای خود راحت تر از عهده آن‌ها بر می‌آیند.

۵. با توجه به مصوبه‌های موجود، کسب مdal دریکی از المپیاد‌های علمی (حتی مdal برتر) باعث اعطای امتیازهای ویژه‌ای برای داوطلبان کنکور در ورود به دانشگاه‌های سراسری می‌شود که جزئیات آن در سایت‌های معتبر مخصوصاً سایت باشگاه دانش پژوهان جوان موجود است.

۶. همچنین با توجه به مصوبه‌های موجود اکثر داوطلبان المپیادها به حضوریت نهادهای مختلف از جمله بنیاد ملی نخبگان در می‌آیند که با رجوع به سایت‌های مرتبط با این نهادها و بنیادها امتیازات تعلق یافته به اعضاء را مشاهده خواهید کرد.

انتشارات خوشخوان مفتخر است از بدو تأسیس به فکر تدوین و تأثیف منابعی مناسب برای دانش آموزان ممتاز و داوطلبان المپیاد بوده است که خوشبختانه با یاری خداوند متعال و با بهره‌گیری از استاید مجری که خود در سنواتی نه چندان دور مدار آوریکی از المپیادهای علمی بوده‌اند، کتب متعددی به بازار عرضه شده است که مورد توجه داوطلبان قرار گرفته است. بعد از کسب تجربیات لازم به این نتیجه رسیده ایم که لازم است کتبی به صورت کار تدوین و تأثیف شود که در آن هر کتاب مخصوص یک ترم تحصیلی باشد. این پروژه به نام درخت المپیاد نام‌گرفته است و هر کتاب از این پروژه که در اختیار دارید برگی از آن درخت خواهد بود.

بدیلی است انجام چنین پروژه‌ی عظیمی نظر و همت دسته جمعی می‌طلبد تذا لازم است از تسامم دوستان و همکارانی که ما را در انجام این پروژه یاری نموده‌اند، تشکر و قدردانی می‌نماییم و درنهایت نیز از عوامل زحمت‌کش انتشارات اعم از مشاورین، حروف چین‌ها، طراحان و کارمندان و کارگران عزیز کمال امتنان را دارم.



با تشکر

رسول حاجی زاده مدیر انتشارات خوشخوان

## مقدمه مؤلفین

### به نام یزدان پاک

با توجه به نیاز دانش پژوهان آزمون های آزمایشی جهت آمادگی برای شرکت در آزمون مرحله‌ی دوم المپیاد ریاضی بر آن شدیم در این راستا قدمی برداریم. امیدواریم این اثر بتواند تا حدی خلاصه موجود در این زمینه را برطرف نماید.

### ساختار آزمون ها

آزمون های مرحله‌ی دوم ریاضی کشوری در دو روز برگزار می‌گردد. آزمون هر روز شامل سه سؤال و زمان ۲۷۰ دقیقه می‌باشد. درجه‌ی سختی سوالات هر روز معمولاً از ساده به سخت است. روال بر این است که در شش سؤال مطرح شده، ۲ سؤال ترکیبیات، ۲ سؤال هندسه، ۱ سؤال جبر و ۱ سؤال نظریه اعداد باشد. در ضمن هر سؤال دارای ۷ نمره می‌باشد و نمره‌ی قبولی آزمون ها معمولاً بین ۲۳ تا ۲۸ نماید. اما ساختار ذکر شده در مواردی رعایت نشده است. به عنوان مثال در آزمون دوره ۱۲۷ (سال ۱۳۸۸) آزمون شامل ۳ سؤال ترکیبیات و ۱ سؤال هندسه بود. همچنین در این آزمون ترتیب سختی سوالات در روز اول رعایت نشده بود و نمره‌ی قبولی این آزمون به ۲۱ رسید. به عنوان مثالی دیگر، در دوره‌ی ۱۲۸ (سال ۱۳۸۹) سوالات نسبت به سال‌های دیگر بسیار ساده‌تر بود و نمره‌ی قبولی به ۳۵ رسید. ما سعی بر آن داشتیم که در عین رعایت ساختار عمومی آزمون های مرحله‌ی دوم ریاضی کشوری استثناهایی از این دست را نیز در محتوی آزمون های این کتاب لحاظ نماییم، تا دانش پژوهان بتوانند با آزمون های متنوع و متناسب با آزمون های مرحله دوم آشنا شوند.

### نحوی آزمون دادن

سعی کنید هر آزمون را در دو روز متوالی و در زمان تعیین شده (آزمون هر روز ۲۷۰ دقیقه) بدهید. همچنین سعی نمایید شرایط یک آزمون رسمی را برای خود فراهم نمایید.

### آنالیز آزمون ها

در انتهای هر آزمون جدولی شامل پیش‌بینی نمره‌ی قبولی آزمون، میانگین نمره‌ی ۱۰۰ نفر اول برای هر سؤال و تعداد افرادی از آنها که نمره‌ی کامل سؤال را می‌گیرند آورده‌ایم. در پیش‌بینی های انجام شده از تجربیات به دست آمده از آزمون های مرحله‌ی دوم بهره برده‌ایم تا پیش‌بینی ها به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

### سخن آخر

از آنجا که این اثر خالقی از اشکال نخواهد بود، از تمام مخاطبان عزیز تقاضا داریم پیشنهادات و انتقادات خود را به پست الکترونیکی [mohamad.jafari66@yahoo.com](mailto:mohamad.jafari66@yahoo.com) ارسال نمایید. از تمامی عزیزانی که ما را در خلق این اثر یاری نمودند سپاسگزاریم.



## فهرست

۱	آزمون ۱
۹	آزمون ۲
۱۹	آزمون ۳
۲۹	آزمون ۴
۳۹	آزمون ۵
۴۹	آزمون ۶
۵۹	آزمون ۷
۶۹	آزمون ۸
۷۹	آزمون ۹
۸۹	آزمون ۱۰
۹۹	آزمون ۱۱





زمان: ۲۷۰ دقیقه

روز اول

۱ ثابت کنید برای هر  $p$  که عددی اول است،  $10^p + 1^p$  نمی‌تواند توان  $n$  یک عدد طبیعی باشد.  
 $(n \geq 2)$

۲ عموم نقاش در اقدامی بی‌سابقه تصمیم به رنگ‌آمیزی نقاطی از فضای مختصات صحیح می‌گیرد. او در هر گام یک دسته ۲۷ تایی از نقاط با مختصات صحیح که تشکیل یک مکعب  $2 \times 2 \times 2$  می‌دهند، انتخاب می‌کند و آن نقاط را رنگ می‌کند (هر ضلع این مکعب شامل ۳ نقطه است). ثابت کنید در یک رنگ‌آمیزی که شامل ۱۱ گام است، نقطه‌ای از فضای وجود دارد که فردبار رنگ شده است.

۳ مثلث حاده‌الزاویه  $ABC$  به مرکز ارتفاعی  $H$  مفروض است.  $D$  را در  $AB$  قطع می‌کند و  $K$  قرینه‌ی  $H$  نسبت به  $AB$  می‌باشد. پای عمودهای وارد از  $D$  بر  $AC$ ،  $BC$  و  $AK$  به ترتیب  $P$ ،  $Q$  و  $R$  باشد. ثابت کنید قرینه‌ی وسط  $AC$  نسبت به مرکز دایره‌ی محیطی  $\triangle PQR$  روی  $BK$  قرار دارد.



## روز دوم

زمان: ۲۷۰ دقیقه



۴ تمام چندجمله‌ای‌های  $P(x)$  با ضرایب حقیقی را بیابید که به ازای هر  $x$  حقیقی داشته باشیم:

$$xP(x) \cdot P(x+1) = xP(x^+) + (1+x^+)P(x)$$

۵ مثلث حاده‌الزاویه  $ABC$  به مرکز ارتفاعی  $H$  مفروض است.  $AH$ ,  $BH$  و  $CH$  اضلاع مقابل شان را به ترتیب در  $E$ ,  $D$  و  $F$  قطع می‌کنند.  $M$  وسط  $BC$  و  $K$  پای عمود وارد از  $A$  بر  $EF$  می‌باشد. ثابت کنید:  $M\hat{H}A = D\hat{K}A$

۶  $n$  نقطه در صفحه قرار دارد که هیچ سه‌تایی هم خط نیستند. از میان پاره‌خط‌های واصل میان این  $n$  نقطه،  $m$  تا را انتخاب می‌کنیم. ثابت کنید از میان این  $m$  پاره‌خط حداقل  $\lceil \frac{2m}{n} \rceil$  پاره‌خط وجود دارد که در شرط‌های زیر صدق می‌کند:

(الف) این پاره‌خط‌ها یک مسیر پیوسته تشکیل دهند (یعنی انتهای هر یک ابتدای دیگری باشد غیر از پاره‌خط انتهایی).

(ب) با شروع از اولین پاره‌خط مسیر و حرکت به سمت آخر روی این پاره‌خط‌ها، طول آن‌ها یک دنباله‌ی صعودی تشکیل دهد.

حل آزمون





## حل آزمون ۱

**۱** می‌توانید ثابت کنید برای  $p = 3$  و  $p = 5$  حکم مسأله برقرار است. بنابراین مسأله را برای  $p \geq 5$  حل می‌کنیم. در این صورت  $p$  به فرم  $6k \pm 1$  می‌باشد. دو حالت زیر را در نظر بگیرید:


$$(1) : p = 6k + 1 \Rightarrow 11^p + 10^p \stackrel{9}{\equiv} 2^p + 1 \stackrel{9}{\equiv} 64^k \times 2 + 1 \stackrel{9}{\equiv} 3$$

$$(2) : p = 6k - 1 \Rightarrow 11^p + 10^p \stackrel{9}{\equiv} 2^p + 1 \stackrel{9}{\equiv} 64^k \times 32 + 1 \stackrel{9}{\equiv} -3$$

پس بنابراین  $11^p + 10^p \stackrel{9}{\equiv} t \pm 3$  می‌باشد در نتیجه توان عدد ۳ در تجزیه‌ی این عدد به عوامل اول برابر ۱ می‌شود پس  $11^p + 10^p$  هیچ‌گاه توان  $n$  ام یک عدد طبیعی نمی‌شود.

**۲** مؤلفه‌های مختصات را اگر به پیمانه‌ی ۳ در نظر بگیریم هر مکعب که انتخاب می‌شود لزوماً تمام ۲۷ حالت مختصات یک نقطه را در پیمانه‌ی ۳ می‌پوشاند. چون تعداد گام‌ها ۲۰ ۱۱ یعنی فرد است پس حتماً حالتی از ۲۷ حالت آمده که دقیقاً فردبار رنگ آمیزی شده است. در میان نقاطی که حالت آن‌ها (یعنی مختصات‌شان در پیمانه‌ی ۳) با آن‌که فردبار رنگ آمیزی شده است یکسان است، حتماً یکی هست که فردبار رنگ شده است یعنی بر فرض اگر حالت  $(1, 2, 0)$  فردبار رنگ شده باشد یکی از نقاطی که مختصاتش به پیمانه‌ی ۳،  $(1, 2, 0)$  می‌شود فردبار رنگ شده است چراکه در غیر این صورت اگر تمام نقاط زوج‌بار رنگ شده باشد، کلاً حالت  $(1, 2, 0)$  هم زوج‌بار رنگ شده است.

**۳** قرینه‌ی  $H$  نسبت به  $AB$  روی دایره‌ی محیطی  $\triangle ABC$  است. بنابراین  $AKBC$  محاطی است. داریم:




$$\hat{C}DN = \hat{P}DK = 90^\circ - \hat{A}KD = \hat{K}AD = \hat{D}CB \Rightarrow DN \text{ وسط } BC \text{ است.}$$

به همین ترتیب  $M$ ،  $E$  و  $F$  اوساط اضلاع  $AKBC$  می‌باشند. می‌دانیم اوساط اضلاع یک چهارضلعی تشکیل یک متوازی‌الاضلاع می‌دهند. اما با توجه به این‌که قطرهای  $AKBC$  برهم عمودند پس  $MNEF$  مستطیل است. با توجه به شکل  $P$  و  $R$  روی دایره‌ای به قطر  $FN$  قرار دارند. اما دایره‌ی

به قطر  $FN$  همان دایره محيطی مستطیل  $MNEF$  است و چون  $\angle MNE = 90^\circ$  است که  $EQ \cdot QM = MS \cdot SE = 90^\circ$  هم روی این دایره قرار دارند. بنابراین مرکز دایره محيطی  $\triangle PQR$  همان مرکز مستطیل است که قرینه‌ی  $M$  نسبت به آن همان  $E$  است که روی  $BK$  قرار دارد.

۴ اگر  $P(x)$  چندجمله‌ای باشد که کمترین درجهٔ جملات آن  $k$  باشد و کمترین درجهٔ جملات  $P(x+1)$  برابر  $k'$  باشد، آنگاه کمترین درجهٔ  $xP(x) \cdot P(x+1) + k + k'$  برابر  $1 + k + k'$  خواهد بود. از طرف دیگر کمترین درجهٔ سمت راست تساوی برابر  $k = \min(2k+1, k)$  خواهد بود. با توجه به این‌که  $1 + k < k' + k$  است. بنابراین چندجمله‌ای وجود ندارد.

۵ ابتدا واضح است که از  $O$  (مرکز دایره محيطی  $\triangle ABC$ ) می‌گذرد زیرا  $\hat{B}C = 90^\circ - \hat{A}$  از طرفی می‌دانیم  $OM \parallel AH$  و  $OM$  دایرگر را در  $P$  روی دایره محيطی قطع می‌کند زیرا  $D\hat{K}P = D\hat{H}P$  و  $OA = OP$  و  $OM = \frac{1}{2}AH$  برای اثبات حکم مسئله کافی است ثابت کنیم  $HKPD$  باید محاطی باشد. داریم:



$$\begin{aligned} A\hat{F}E = \hat{C} &= \frac{\widehat{AB}}{2} = A\hat{P}B \Rightarrow BFKP \text{ محاطی} \\ \Rightarrow AF \cdot AB &= AK \cdot AP \tag{I} \\ \text{محاطی } BFHD &\Rightarrow AF \cdot AB = AH \cdot AD \stackrel{(I)}{\Rightarrow} AH \cdot AD = AK \cdot AP \\ \text{محاطی } HKPD & \end{aligned}$$

۶ روی هر یک از  $n$  نقطه یک رهنورد قرار می‌دهیم. عمل انتخاب یک پاره خط را جایه‌جا شدن رهنوردهای دو سر آن پاره خط در نظر بگیرید. حال این  $m$  پاره خط را به ترتیب طول از کم به زیاد انتخاب می‌کیم. در این صورت  $2m$  حرکت رهنورد داریم. پس حداقل  $\lceil \frac{2m}{n} \rceil$  از این حرکت‌ها متعلق به یک رهنور است (اصل لانه کبوتر). این رهنورد مسیر مطلوب ما را پیموده است.



## آنالیز آزمون ۱

شماره سؤال	پیش‌بینی میانگین نمره ۱۰۰ نفر برتر	پیش‌بینی تعداد افراد بین ۱۰۰ نفر برتر که نمره کامل مسئله را می‌گیرند
۱	۵/۵	۷۲ نفر
۲	۳/۵	۳۷ نفر
۳	۳/۵	۳۸ نفر
۴	۶	۸۲ نفر
۵	۴	۵۰ نفر
۶	۲	۱۷ نفر

پیش‌بینی نمره‌ی قبولی: ۲۸

\* هر سؤال ۷ نمره دارد.





## زمان: ۲۷۰ دقیقه

## روز اول

۱ معادله‌ی زیر برای  $x \in (1, \infty)$  چند جواب دارد؟

$$\frac{x}{1+x} + x^2 = \frac{1}{x^2} + \frac{x}{x-1}$$

۲ می‌دانیم در میان تمام اشکال با مساحت برابر دایره کمترین محیط را دارد و بنابراین از آنجایی که نسبت مساحت به مربع محیط در دایره برابر  $\frac{1}{4\pi}$  است برای هر شکل دیگر این نسبت کوچک‌تر یا مساوی  $\frac{1}{4\pi}$  است.

شکل روی صفحه مشبکه به شکلی می‌گوییم که در دستگاه مختصات فرضی رؤوسی با مختصات صحیح و اضلاعی موازی با دو محور طول‌ها و عرض‌ها داشته باشد. در میان اشکال روی صفحه مشبکه بهترین عددی که می‌توان جایگزین  $\frac{1}{4\pi}$  کرد چه عددی است و به ازای چه شکلی به دست می‌آید؟

۳ مثلث حاده‌الزاویه  $\triangle ABC$  به مرکز دایره‌ی محیطی  $O$  و مرکز دایره محاطی  $I$  و مرکز ارتقای  $H$  مفروض است. دایره‌ی محاطی  $\triangle ABC$ ,  $BC$  را در  $D$  قطع می‌کند. ثابت کنید اگر  $OI$  موازی  $BC$  باشد آنگاه  $HD$  موازی  $OA$  است.



## روز دوم



زمان: ۲۷۰ دقیقه

۴ جناب آفای کلاسیفاید (Classified)  $2^n$  چوق (وجه رایج کشور کلاسیفایدهای متحرک) را که کل دارایی او را تشکیل می‌دهد در تعدادی بانک پخش کرده است اما از کار خود پشیمان است و می‌خواهد تمام پول را به یک بانک انتقال دهد. عمل انتقال پول در کشور او به روش سحاب (سامانه‌ی حواله‌ی بین بانکی) صورت می‌گیرد. به این شکل که اگر او در دو بانک به ترتیب مبالغ  $a$  و  $b$  ( $b \geq a$ ) را داشته باشد پس از استفاده از سحاب به ترتیب مبالغ  $2a$  و  $b - a$  را در آن دو بانک دارد. همچنین او در هر بانک فقط یک حساب دارد. نشان دهید او می‌تواند به هدفش برسد. ( $n$  عددی طبیعی است.)

۵ چهارضلعی محاطی  $ABCD$  به طوری که  $BC = CD$  و  $AB = AD$  مفروض است.  $M$  وسط  $AD$  می‌باشد. عمود وارد از  $C$  بر  $AD$ ،  $BM$  را در  $P$  قطع می‌کند. ثابت کنید  $PB$  بر دایره‌ی محیطی  $ABCD$  مماس است.

۶ تمام اعداد طبیعی را بیابید که  $n^3 - n - 3$  مربع کامل شود.

حل آزمون



## حل آزمون ۲

**۱** می دانیم  $x^2$  و  $\frac{x}{1+x}$  در بازه  $(1, \infty)$  با افزایش  $x$ , افزایش می یابند. بنابراین تابع  $f(x) = x^2 + \frac{x}{1+x}$  در بازه  $(1, \infty)$  اکیداً صعودی است. از طرف دیگر  $\frac{1}{x^2} + \frac{x}{x-1}$  نیز در بازه  $(1, \infty)$  با افزایش  $x$ , کاهش می یابند. بنابراین تابع  $g(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{x}{x-1}$  در بازه  $(1, \infty)$  اکیداً نزولی است. بنابراین  $h(x) = f(x) - g(x)$  اکیداً صعودی خواهد بود. حال اگر  $h(x) = f(x) - g(x)$  در نظر بگیریم،  $h(x)$  در بازه  $(1, \infty)$  مورد نظر پیوسته است (چرا؟) از طرفی داریم:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = -\infty \end{cases}$$


پس  $h(x)$  دقیقاً یک ریشه‌ی حقیقی در بازه  $(1, \infty)$  مورد نظر دارد.

**۲** فرض کنید  $F$  را در صفحه‌ی مشبکه داریم که نسبت مساحت به مریع محیطش ماکسیمم است. ادعا می‌کنیم  $F$  یکپارچه (متشكل از یک تکه) است زیرا در غیر این صورت یکی از تکه‌ها را به دیگری نزدیک می‌کنیم تا هم مرز شوند. در این صورت با حفظ مساحت، محیط کاهش می یابد که خلاف فرضی است که کرده بودیم.

مینیمم و ماکسیمم طول رؤس  $F$  را در صفحه‌ی مشبکه (با مختصات بندی)،  $x_0$  و  $y_0$  در نظر بگیرید. چون  $F$  یکپارچه است مرزهای آن حداقل  $|x_0 - y_0|$  یا افقی دارد زیرا اگر روی محیط  $F$  دور بزنیم یک بار از سمت چپ‌ترین نقطه  $F$  به سمت راست‌ترین نقطه‌ی آن می‌رویم و باز می‌گردیم. با استدلال مشابه برای عرض  $F$  نتیجه می‌شود مرز آن حداقل  $|y_0 - x_0|$  یا عمودی دارد. فرض کنید  $w = y_0 - x_0$  و  $h = x_0 - y_0$ . محیط  $F$  حداقل  $2w + 2h$  است. از طرفی  $F$  در مستطیلی با اضلاع  $w$  و  $h$  قرار می‌گیرد. پس مساحت آن ناگزینه از  $wh$  است. پس نسبت مذکور حداقل  $\frac{wh}{4(w+h)^2}$  است. طبق نامساوی حسابی - هندسی  $\frac{wh}{4(w+h)^2} \geq \frac{1}{16}$  است. طبق حالت تساوی حسابی - هندسی زمانی رخ می‌دهد که  $w = h$  باشد، یعنی  $F$  مریع باشد.

**۳** لم:  $ID$  دایره‌ی محاطی را برای بار دوم در  $K$  و  $AK$ ,  $BC$  را در  $D'$  قطع می‌کند.

آنگاه  $BD = CD'$




اثبات: مماس در  $K$  بر دایرهٔ محاطی موازی  $\triangle AB'C'$  است. چون  $\triangle AB'C' \sim \triangle ABC$  و دایرهٔ محاطی داخلی  $\triangle ABC$  نقش دایرهٔ محاطی خارجی نظیر رأس  $A$  را برای مثلث  $AB'C'$  دارد، بنابراین  $AK$  را در محل برخورد آن با دایرهٔ محاطی خارجی نظیر رأس  $A$  برای مثلث  $ABC$  قطع می‌کند، که در این صورت می‌دانیم  $\frac{AB + BC - AC}{2} = BD = CD'$ .

**حل مسئله:**  $D'$  نقطه‌ای روی  $BC$  است که  $MD = MD'$  و سط  $BC$  است).

در نتیجه  $OMDI$  مستطیل است پس  $OM \parallel BC$  داریم:

$$\left. \begin{array}{l} OM = \frac{1}{2} DK \\ OM \parallel DK \\ MD = MD' \end{array} \right\} \Rightarrow O, K \text{ و } D' \text{ هم خط‌اند.}$$




اما طبق لم ذکر شده می‌دانیم  $A, K$  و  $D'$  هم خط‌اند پس می‌توان نتیجه گرفت  $A, K$  و  $O$  هم خط‌اند.

$$\begin{aligned} OM &= \frac{1}{2} AH \Rightarrow KD = AH \Rightarrow \text{متوازی‌الاضلاع } AKDH \\ \Rightarrow AK \parallel DH &\Rightarrow HD \parallel OA \end{aligned}$$

۴ با توجه به این‌که کل موجودی زوج است پس تعداد حساب‌ها با موجودی فرد، زوج است. سحاب را روی جفت حساب‌های فرد اعمال می‌کنیم و با توجه به این‌که سحاب موجودی‌ها را زوج می‌کند تمام حساب‌های فرد به حساب‌هایی با موجودی زوج تبدیل می‌شوند. حال با استفاده از استقرا ثابت می‌کنیم آقای کلاسیفاید به هدف خود می‌رسد. پایه‌ی استقرا واضح است. فرض کنید حکم برای  $n = k$  درست باشد. درستی آن را برای  $n = k + 1$  نتیجه می‌گیریم. با توجه به آنچه گفته شد موجودی تمام حساب‌ها زوج می‌شود. حال هر ۲ چوک را یک بسته در نظر بگیرید. ۲<sup>k</sup> بسته داریم که سحاب روی آن‌ها قابل اجراست. لذا طبق فرض استقرا حکم درست و اثبات کامل است.

۵ ابتدا واضح است که  $\hat{B} = 90^\circ$ . فرض کنید  $AM = \hat{D} = x$  و  $AP = y$ . داریم:



$$\begin{aligned} PC \perp BM &\Rightarrow PM^2 - PB^2 = MC^2 - BC^2 \\ \xrightarrow{BC=CD} PM^2 - PB^2 &= MC^2 - CD^2 \\ \xrightarrow{\hat{D}=90^\circ} (x+y)^2 - PB^2 &= MD^2 = x^2 \\ \Rightarrow PB^2 &= (x+y)^2 - x^2 = y(y+2x) = AP \cdot PD = p_w^p \\ \Rightarrow \text{بر دایره محاس است } PB \end{aligned}$$

۶ فرض کنید  $m$  وجود داشته باشد که:  $n^3 - m^2 = n^3 - n - 3 = m^2$ . با توجه به این‌که  $n^3 - m^2$  زوج است پس  $m^2$  عددی فرد است، بنابراین  $1 \stackrel{\wedge}{\equiv} m^2 \stackrel{\wedge}{\equiv} 4$  پس داریم:

$$\begin{aligned} n^3 - n \stackrel{\wedge}{\equiv} 4 &\Rightarrow n \stackrel{\wedge}{\equiv} 4 \tag{I} \\ n^3 - n - 3 = m^2 &\Rightarrow n^3 - n + 6 = m^2 + 9 \\ \Rightarrow (n+2)(n^2 - 2n + 4) - (n+2) &= m^2 + 9 \\ \Rightarrow (n+2)(n^2 - 2n + 3) &= m^2 + 9 \end{aligned}$$

با توجه به  $(I)$ ,  $n + 2$  به فرم  $8k + 6$  و  $2n + 3$  به فرم  $8k + 3$  می‌باشد. بنابراین هر دو پرانتز عامل اولی به فرم  $4k + 3$  دارند (چرا؟). از آنجایی که هر دو عدد  $n + 2$  و  $2n + 3$  هم‌زمان نمی‌توانند بر  $3$  بخش‌پذیر باشند پس حداقل یکی از دو عامل اولی که به فرم  $4k + 3$  هستند غیر  $3$  می‌باشد. فرض کنید این عامل  $p$  باشد. داریم:

$$p|(n+2)(n^2 - 2n + 3) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} p|m^2 + 9 \\ p \equiv 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} p|m \\ p|3 \end{array} \right. *$$

بنابراین  $3 - n - n^3$  هیچ‌گاه مربع کامل نمی‌شود.

## آنالیز آزمون ۲

شماره سؤال	پیش‌بینی میانگین نمره ۱۰۰ نفر برتر	پیش‌بینی تعداد افراد بین ۱۰۰ نفر برتر که نمره کامل مسئله را می‌گیرند
۱	۵/۵	۷۲ نفر
۲	۳/۵	۴۰ نفر
۳	۳/۵	۳۵ نفر
۴	۵	۶۰ نفر
۵	۴/۵	۵۵ نفر
۶	۲/۵	۲۲ نفر

پیش‌بینی نمره‌ی قبولی: ۳۰

\* هر سؤال ۷ نمره دارد.





## روز اول

۲۱ آزمون ۳

زمان: ۲۷۰ دقیقه

۱ همهی اعداد  $x$  و  $y$  را بیابید که  $x, y \in \mathbb{Z}$  و  $13x^2 = 1391y^2 + 1$ . (مجموعهی اعداد صحیح است)

۲ مثلث حاده‌الزاویه  $ABC$  با مرکز  $O$  می‌باشد. فرض کنید دایره‌ی  $\omega$  به مرکز  $S$  که در  $A$  بر دایره‌ی  $C$  و در  $D$  بر  $BC$  مماس است، اضلاع  $AB$  و  $AC$  را به ترتیب در  $E$  و  $F$  قطع می‌کند.  $AS$  و  $ES$  را برای بار دوم به ترتیب در  $I$  و  $G$  قطع می‌کنند و همچنان  $IG$ ،  $OB$  را در  $H$  قطع می‌کند. ثابت کنید:  $GH = \frac{DF}{AF}$ .

۳ در هر یک از خانه‌های جدولی  $m \times n$  ( $m, n \in \mathbb{N}$ ) یک مهره قرار دارد که یک روی آن سیاه و روی دیگر آن سفید است. در ابتدا روی سفید تمام مهره‌ها غیر از مهره‌گوشی بالا و چپ معلوم است (بالطبع مهره‌گوشی مذکور دارای روی سیاه است). در هر گام یک مهره‌گوشی با روی سیاه برداشته می‌شود و تمام مهره‌های همسایه (در خانه‌هایی مشترک در یک ضلع) تغییر وضعیت می‌دهند. تمام دو تایی‌های ( $m, n$ ) را بیابید که بتوان تمام مهره‌های جدول را برداشت.